

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:パンシロンキュア 胃腸薬

すっきり
服用感

ストレス・飲み過ぎによる胃痛・胸やけに パンシロン[®] キュア

第2類医薬品

こんな状況下によく効きます



空腹時によく
ギュっと痛む



ムカムカする
胃の不快感に



製品の特徴

ストレスやアルコールなどにより胃に負担がかかると、胃酸の出過ぎ、胃粘液の分泌抑制などがおこり、胃の痛みや不快感といった症状があらわれやすくなります。

「パンシロンキュア」は、「出過ぎた胃酸の中和作用」

「胃粘膜の保護作用」「胃酸分泌抑制作用」の

トリプルアクション処方で痛みを引き

起こす胃酸から胃を守るとともに、痛みを和らげていきます。

ストレスなどで胃の調子が悪いなど

感じたら「パンシロンキュア」をどうぞ。

胃粘膜の
保護作用

トリプルアクション
処方

出過ぎた胃酸の
中和作用

胃酸分泌
抑制作用



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (2) 透析療法を受けている人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

胃腸鎮痛鎮痙攣薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある)

4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 授乳中の人は
- (3) 高齢者
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人
 排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人
 緑内障、腎臓病

2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|------|---------------|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | はきけ、胃部膨満感 |
| その他 | 排尿困難、動悸、目のかすみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-------------|--------------------------|
| アナフィラキシー様症状 | 胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる |

(2)2週間位服用しても症状がよくならない場合

3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

便秘、下痢、口のかわき

■ 効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心）、嘔吐、飲み過ぎ（過飲）、胃痛

■ 用法・用量

次の量を食前又は食間の空腹時に水又はお湯で服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-------|-----|---------|
| 15才以上 | 1包 | 3回 |
| 15才未満 | | 服用しないこと |

*食間とは…食後2～3時間をさします。

(用法・用量に関連する注意)

(1)用法・用量を厳守してください。

■ 成分・分量(1日量3包中)

| 有効成分 | 配合量 |
|--------------|---------------------|
| 水酸化マグネシウム | 450mg |
| 合成ヒドロタルサイト | 780mg |
| 沈降炭酸カルシウム | 900mg |
| ホップ乾燥エキス-S | 33mg(ホップとして471.5mg) |
| アルジオキサ | 150mg |
| ピレンゼビン塩酸塩水和物 | 46.9mg |

添加物：キシリトール、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、炭酸水素ナトリウム、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、トコフェロール酢酸エステル、ト-メントール、香料

■ 保管及び取扱上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)

(4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先:お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

400858202