

井藤漢方製薬

センナ錠I (アイ)

試しやすい 7回分 ※1

※1 1回6錠の場合

便秘

便秘に伴う 次の症状の 緩和

肌あれ 食欲不振



便秘



肌あれ ※2



食欲不振 ※2

※2 便秘に伴う症状を緩和

便秘治療薬

第②類医薬品

生薬製剤

42錠 7回分 (15才以上 1回6錠の場合) 1回3~6錠 粒はイメージです

POS 0.85倍見本 4 987645 100059

MADE IN JAPAN

ここからお切りください。

開封後はチャックを閉めて保管してください

使用上の注意

- してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
3. 大量に服用しないこと

相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

Table with 3 columns: 関係部位, 皮膚, 消化器. Row 1: 発疹・発赤、かゆみ. Row 2: はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

- 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能 便秘 便秘に伴う次の症状の緩和: 頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

用法・用量 次の量を就寝前又は空腹時に服用

Table with 3 columns: 年齢, 1回量, 服用回数. Rows for 大人(15才以上), 15才未満

用法・用量に関連する注意 ●用法・用量を厳守すること。

初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。

成分 6錠中 センナ末 750mg 添加物として、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロースを含有する。

保管及び取り扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)ぬれた手で触れないこと。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

井藤漢方製薬株式会社 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-4-1

製造番号 使用期限

お客様相談室 ☎06-6743-3033 10:00~17:00(土日祝を除く)

101010005 5820338 -1-M24X

