

切り口

切り口からゆっくり開封してください

切り口

開封後は、ファスナー部を合わせ密封保存してください

鎮痛消炎薬 第2類医薬品 リフェンダLXテープ 7枚入

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

ⓧ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用して
よくなることを感じたことがある人。
- (3)15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。(2)しつしん、かぶれ、傷口。
- (3)みずむしたむし等または化膿している患部。

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください

4. 連続して2週間以上使用しないでください

- (本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください。)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)妊娠または妊娠していると思われる人。(4)高齢者。(5)次の診断を受けた人。気管支ぜんそく

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

製造番号

AF26AT

使用期限

2024.05

用法・用量

○表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。(2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(3)1日あたり4枚を超えて使用しないでください。(4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。(5)皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

製造販売元 株式会社タカミツ

〒462-0803 名古屋市北区上飯田東町4の68の1

本剤についてのお問い合わせは、下記にお願いします。
株式会社 タカミツ 電話 0120-459533(フリーダイヤル)
受付時間(月～金曜日 9:00～17:00 祝日を除く)

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931



A